

Konizacija je terapevtski poseg, pri katerem s skalpelom izrežemo del materničnega vratu z bolezenskimi spremembami. Po izrezanju maternični vrat obšijemo z dvema šivoma in v nožnico vstavimo trak za zaustavljanje krvavitve. Tkivo pošljemo na histološko preiskavo, ki jo opravi patolog s pomočjo mikroskopa. Trak iz nožnice odstranimo dan po operaciji.

Poseg opravimo v bolnišnici, v operacijski dvorani v področni ali splošni anesteziji. Zdravila za lajšanje bolečin po posegu se običajno dodajo že med anestezijo, ob močnejših bolečinah pa tudi po posegu. Na vsa vprašanja v zvezi s predvideno anestezijo vam bo odgovoril anesteziolog.

Konizacija je večinoma varen poseg, a ima kot vsak kirurški poseg možne zaplete:

- med posegom ne vidimo v kanal materničnega vratu, zato je možno, da spremembe ne odstranimo v celoti,
- po posegu se redko lahko pojavi vnetje ali večja krvavitev iz nožnice,
- zoženje ali zaprtje kanala materničnega vratu,
- prezgodnji porod v sledečih nosečnostih je redek,
- anesteziološke zaplete (slabost, bruhanje, alergične reakcije), ki vam jih bo pojasnil anesteziolog.

Celjenje rane bo trajalo tri do štiri tedne. V tem času bo iz nožnice nekoliko več krvavkastega izcedka ali blagi menstruaciji podobna krvavitev.

Na vaša morebitna dodatna vprašanja bo natančneje odgovoril operater pred posegom.

Pred odpustom iz bolnice vas bo zdravnik seznanil s potekom posega in vam dal ustrezna (pisna) navodila.