

To je operacija, pri kateri se na laparoskopski način odstrani telo maternice, ohrani pa se maternični vrat.

### **Indikacije**

Indikacija za operacijo so benigne (nenevarne) bolezni maternice. To so lahko miomi maternice, endometrioza, adenomioza maternice, nenormalne krvavitve iz maternice, ki se jih ne da pozdraviti na konzervativen način ter kronične bolečine v mali medenici.

### **Priprava na operacijo**

Bolnica dobi v specialistični ambulanti navodila o potrebnih preiskavah pred operativnim posegom. Dan pred posegom je sprejeta na oddelek, zvečer dobi injekcijo zdravila proti strjevanju krvi.

### **Potek operacije**

Operacija poteka v splošni anesteziji. Ko bolnica zaspi, vstavimo v sečni mehur urinski kateter in preko njega vbrizgamo modrilo. Tako hitreje prepoznamo morebitno poškodbo sečnega mehurja med operacijo. Naredimo majhne reze na spodnjem delu trebuha in enega tik pod popkom, skozi katere v trebušno votlino uvedemo inštrumente. Najprej trebušno votlino napolnimo s plinom CO<sub>2</sub>, da pridobimo prostor za operiranje in varno uvajanje inštrumentov. Nato s posebnim nožem, harmoničnim skalpelom, ki povzroča minimalno poškodbo tkiva, odstranimo celo maternico, ki jo nato odstranimo skozi nožnico. Nožnico zašijemo z zgornje strani. Trebušno votlino speremo s tekočino, preverimo morebitno krvavitev, izpustimo plin in zašijemo ranice na koži. Odstranjeno telo maternice rutinsko pošljemo na patohistološko preiskavo.

### **Trajanje zdravljenja**

Ko se bolnica zbudi iz splošne anestezije, jo za tri ure prestavimo v prebujevalnico, nato pa za dva dni v sobo za intenzivno nego na oddelku. Bolnico 3. dan po operaciji (dan operacije se ne šteje) odpustimo v domačo oskrbo, priporočamo pa dva do tri tedne počitka in bolniškega staleža. Šivi kože odpadejo sami, odstranitev ni potrebna.

### **Možni zapleti**

- zapleti zaradi anestezije
- poškodba organov v trebušni votlini
- močna krvavitev iz materničnih žil med operacijo
- strdek v venah nog ali pljučih
- vnetje kožnih ran